

PARPADOS

- **Hendidura palpebral**

10 – 12 mm alto

30mm ancho

- **Borde superior**


2mm limbo

- **Borde inferior**

Limbo

- **Canto Interno**



- **Canto Externo**



IMPORTANCIA


BENIGNIDAD

- ♦ Bien definida
- ♦ Márgenes lisos
- ♦ Aspectos quísticos
- ♦ No progresivo



MALIGNIDAD


- ♦ Ausencia de pestañas
- ♦ Ulceración (sangrado)
- ♦ Telangiectasias
- ♦ Cambios en tamaño, color, contorno
- ♦ Recurrencia tras tratamiento



NODULOS Y QUISTES BENIGNOS

ORZUELO: INTERNO / EXTERNO

- ◊ Pequeño absceso
- ◊ Infección estafilocócica aguda
 - Dolor y edema
 - Tratamiento: Calor local + pomada



CHALACION

- ◊ Quiste de Meibomio.
- ◊ Lesión inflamatoria lipogranulosa crónica causada por el bloqueo de los orificios glandulares y el estancamiento de las secreciones sebáceas.



NODULOS Y QUISTES BENIGNOS

MOLLUSCUM

- ◈ Infección cutánea infrecuente causada por un poxvirus.
- ◈ Nódulos umbilicados, céreos, únicos o múltiples



QUISTES DE MILIO

- ◈ Derivan de los folículos pilosos o de las glándulas sebáceas.
- ◈ Formado por quistes superficiales diminutos, redondeados y blancos que tienden a aparecer en grupos.



NODULOS Y QUISTES BENIGNOS

QUISTE DE MOLL

- ◊ Lesión translúcida
- ◊ Llena de líquido,
- ◊ redondeada y pequeña



HIDROCISTOMA ECRINO

- Lesión translúcida
- Llena de líquido,
- No confinada al borde palpebral



QUISTE DE ZEISS

- ◊ Menos translúcido
- ◊ Secreciones oleosas
- ◊ En borde anterior palpebral



TUMORES BENIGNOS

◇ XANTELASMAS

- ◇ Placas subcutáneas amarillentas constituidas por colesterol y lípidos.
- ◇ Suelen localizarse en las zonas mediales de los párpados

◇ PAPILOMA ESCAMOSO

- ◇ (¿VERRUGA VIRAL??)
 - ◇ Pedunculada / sésil
 - ◇ Superficie aframbuesada
 - ◇ Muy frecuente
 - ◇ Adulto joven, edad senil



TUMORES BENIGNOS

QUERATOSIS SEBORREICA

- ◊ Papiloma basocelular
- ◊ Placa aislada, marrón de superficie friable y aspecto pegajoso.
- ◊ Ancianos



QUERATOSIS ACTÍNICA

- ◊ Lesión premaligna
- ◊ Placa hiperqueratósica de bordes nítidos y superficie escamosa
- ◊ Siempre BIOPSIA!!
- ◊ Rara en párpados



TUMORES BENIGNOS

◈ GRANULOMA PIÓGENO

- ◈ Hemangioma granulomatoso de crecimiento rápido.
- ◈ Puede sangrar después de un traumatismo trivial.

◈ NEVUS MELANOCITICO ADQUIRIDO

- ◈ Bajo potencial malignidad (=congénito)



De la unión (dermo-epidérmica)
o compuesto



Intradermico (no pigmentado)
Más frecuente

TUMORES BENIGNOS

HEMANGIOMA CAPILAR

NEVUS EN FRESA


- ◊ Lactantes. Párpado sup
 - ◊ Remitir a oftalmología
 - ◊ Ambliopía por ptosis, astigmatismo
 - ◊ Descartar extensión orbitaria, RNM
- ◊ Angiomas, en edad adulta



HEMANGIOMA CAVERNOSO

NEVUS FLAMMEUS

- ◊ Asociado a Sd Sturge -Weber



TUMORES MALIGNOS

TUMORES MALIGNOS

CAR. CELULAS BASALES

- ◊ Neoplasia más frecuente
- ◊ Neoplasia mas frecuente del párpado
- ◊ Párpado inferior
- ◊ Crecimiento lento y localmente invasivo
- ◊ Telangiectasias en superficie
- ◊ Edad senil

CAR. ESPINOCELULAR

- ◊ 1rio / 2rio Q. actínica
- ◊ Más frecuente en piel blanca
- ◊ Párpado inferior
- ◊ Crecimiento más rápido
- ◊ Similar a papiloma o a un cuerno cutáneo.
No tiene telangiectasias
- ◊ Edad senil

TUMORES MALIGNOS


CAR. CELULAS BASALES



CAR. ESPINOCELULAR




◊ Edad senil



TUMORES MALIGNOS

- ◇ CARCINOMA DE GLÁNDULA SEBACEA
 - ◇ Muy raro
 - ◇ PÁRPADO SUPERIOR
 - ◇ Edad senil. Mujeres
 - ◇ “Chalación crónica”, “Blefaritis crónica”
 - ◇ Alta tasa de mortalidad, por retraso en diagnóstico



TUMORES MALIGNOS

LENTIGO MALIGNO

- ◊ MELANOMA “IN SITU”
- ◊ Mácula pigmentada
- ◊ En ancianos
- ◊ Expansión lenta
- ◊ Borde irregular

REMITIR PARA BIOPSIA!!


MELANOMA

- ◊ Muy raro en párpados
- ◊ 50% no pigmentados (difícil Dx)
- ◊ Lesión pigmentada preexistente
- ◊ DE DISEMINACIÓN SUPERFICIAL
 - ◊ NODULAR

TUMORES MALIGNOS


LENTIGO MALIGNO

- ◇ MELANOMA “IN SITU”
- ◇ Mácula pigmentada



MELANOMA

- ◇ Muy raro en párpados
- ◇ 50% no pigmentados (difícil Dx)
- ◇ Lesión pigmentada preexistente
- ◇ DE DISEMINACIÓN SUPERFICIAL
- ◇ NODULAR



TUMORES MALIGNOS

- ◈ CARCINOMA CÉLULAS DE MERKEL
 - ◈ Muy maligno, de muy rápido crecimiento
 - ◈ Tumor de la dermis
 - ◈ Nódulo violáceo bien delimitado recubierto por piel normal
 - ◈ Párpado superior
- ◈ SARCOMA DE KAPOSI
 - ◈ VIH+
 - ◈ Tumor vascular
- ◈ QUERATOACANTOMA
 - ◈ Variedad del carcinoma espinocelular

