


ACTUACIÓN ANTE EL HALLAZGO ECOGRÁFICO DE LESIONES HEPÁTICO/BILIARES EN ATENCIÓN PRIMARIA

DR. F. DOMINGUEZ
SERVIZO A. DIXESTIVO
HOSPITAL ALVARO CUNQUEIRO
VIGO



ESCENARIOS DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA SUSCEPTIBLES DE ABORDAJE POR EL MÉDICO DE FAMILIA



ESCENARIOS DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA SUSCEPTIBLES DE ABORDAJE POR EL MÉDICO DE FAMILIA

Ecografía Hepática y biliar


- Alteración enzimas hepáticas
- Síndrome constitucional
- Patrón de colestasis disociada
- Seguimiento de lesiones benignas (quistes, hemangiomas...)
- Hepatomegalia
- Dolor en HD
- Ictericia
- Elevación de Bil-FA
- Dolor en HD con fiebre.



ESCENARIOS DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA SUSCEPTIBLES DE ABORDAJE POR EL MÉDICO DE FAMILIA

Fatty liver


- Posterior sound attenuation.
- Enlarged liver.
- Tend to have fine homogeneous echotexture.




ESCENARIOS DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA SUSCEPTIBLES DE ABORDAJE POR EL MÉDICO DE FAMILIA



ESCENARIOS DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA SUSCEPTIBLES DE ABORDAJE POR EL MÉDICO DE FAMILIA



ESCENARIOS DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA SUSCEPTIBLES DE ABORDAJE POR EL MÉDICO DE FAMILIA



- Child A-B
- Child C en LeTHO
- VHC Fibrosis ≥ 3

VBH:

- Fibrosis < 2
- < 40 y DNA-VHB < 20.000 UI

ESCENARIOS DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA SUSCEPTIBLES DE ABORDAJE POR EL MÉDICO DE FAMILIA

PHT: US Findings

- Portal vein
 - diameter > 13 mm
> 16 mm deep insp
 - sens: 45 - 50%
 - spec: near 100%
 - loss of respiratory variation
 - ↓ velocity
 - bidirectional
 - reversed



ESCENARIOS DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA SUSCEPTIBLES DE ABORDAJE POR EL MÉDICO DE FAMILIA



ESCENARIOS DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA SUSCEPTIBLES DE ABORDAJE POR EL MÉDICO DE FAMILIA




- > 10 cm o Sintomático
- Embarazo
- AAOO

> 10 cm... Anual



ESCENARIOS DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA SUSCEPTIBLES DE ABORDAJE POR EL MÉDICO DE FAMILIA



- >10 mm/Sx -- Qx
- 6-9 mm----- 6 m
- <6 mm-----12 m

No

